

El control de la transmisión en la clínica dental

Lavado de manos minucioso, antes y después de cada paciente con gel a base alcohólica.

Uso sistemático de mascarilla, gafas protectoras y ropa clínica.

Antes de proceder al tratamiento, enjuague bucal durante 1 minuto con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2%. La clorhexidina no es eficaz frente al coronavirus.

Siempre que sea viable, usar aislamiento absoluto con dique de goma (reduce concentración de virus en aerosoles un 70%).


Usar instrumental rotatorio con válvula anti retorno (la mayoría de las actuales lo llevan).

Realizar limpieza y desinfección minuciosa de todas las superficies de trabajo, después de tratar a cada paciente.

Realizar limpieza, desinfección y esterilización del instrumental con los métodos habituales.

El control de la transmisión en la clínica dental

Guía de manejo frente al Coronavirus en la clínica dental



Recomendaciones a 10 de marzo de 2020

El virus y las vías de transmisión

Pertenece a la familia de los Coronaviridae tratándose de un virus RNA.

Las vías de transmisión incluyen la directa (tos, estornudo, gotitas de Flügge) así como transmisión por contacto (mucosa oral, nasal, y ocular).

El virus está presente en saliva.

En el contexto dental, el virus puede transmitirse por inhalación de aerosoles, contacto con mucosas y con superficies contaminadas.

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?

¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días?

¿Ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días?

¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus?

¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los últimos 14 días?

La evaluación del paciente: el cuestionario

La evaluación del paciente: la toma de decisiones

SÍ a cualquiera de las preguntas y su temperatura está por debajo de 37.3°C: demorar tratamiento (salvo urgencia) 14 días.

SÍ a cualquiera de las preguntas y temperatura por encima de 37.3°C: avisar de posible contagio.

NO a cualquiera de las preguntas pero temperatura por encima de 37.3°C: demorar tratamiento 14 días (salvo urgencias).

NO a cualquiera de las preguntas y no tiene fiebre: tratar con las medidas indicadas.